

INTEREX® INTEREX® SPRAY



Gegen Fliegen, Ektoparasiten und andere Schädlinge

- Sofort- und Langzeitwirkung
- Auch im belegten Stall – bei sachgemäßer Anwendung – einsetzbar
- Inhalt der 500-ml-Flasche (Konzentrat) reicht für bis zu ca. 500 m² Stallfläche
- Fraß- und Kontaktgift

Anwendungsbereiche:

Ektoparasiten und Fliegen können Krankheiten in Tierbeständen übertragen und damit zu schlechter Futterverwertung führen. Zudem erzeugen diese Schädlinge Stress bei Zucht- und Masttieren.

Mit INTEREX® und INTEREX® SPRAY können Sie dies verhindern.

INTEREX®

ist hervorragend geeignet für große Flächen in Tierställen aller Art, wie z. B. Schweine-, Rinder-, Schaf-, Ziegen-, Geflügel und Taubenställen sowie Wirtschaftsräumen, Milchkammern und Dielen.

INTEREX® SPRAY

für kleine Flächen in Taubenschlägen, Vogelkäfigen, Zwingern, Tierbuchten und anderen Räumen im landwirtschaftlichen Bereich.

Anwendungsmethode und Dosierung:

INTEREX®

Lösung ansetzen, umrühren und mit niedrigem Druck auf Flächen und Gegenstände sprühen, die von Fliegen und Ungeziefer bevorzugt werden: Säulen, Balken, Fensterrahmen, Trennwände, Boxenwände, Ritzen und Nischen.

INTEREX® SPRAY

Das Spray ist gebrauchsfertig. Dose vor Gebrauch schütteln. Von Ungeziefer und Fliegen bevorzugte Flächen, Schlupfwinkel und Laufflächen aus etwa 30 cm Abstand besprühen, bis die Flächen leicht feucht erscheinen.

INTEREX®	+	Wasser	=	Gebrauchslösung
100 ml		10 Liter		1 %

10 l Gebrauchslösung reichen für ca. 100 m² Fläche.



Wirkung:

INTEREX® hat ein sehr breites Wirkungsspektrum. Durch das spezielle Fraß- und Kontaktgift wirkt es gegen

- Ektoparasiten, wie z. B. rote Vogelmilben, Räudemilben, Zecken, Federlinge, Haarlinge, Flöhe, Läuse etc.
- Fliegen aller Art
- Weitere Schädlinge, wie z. B. Schaben, Motten, Wespen, Silberfischchen, Ameisen, Spinnen, Asseln etc.

Milbenbekämpfung:

INTEREX® möglichst abends ausbringen. Gegebenenfalls ein- bis zweimal nach jeweils 7 Tagen die Behandlung wiederholen um die Neublage von Milbeniern zu verhindern.



Fliege

Musca domestica




Rote Vogelmilbe

Dermanyssus gallinae



Milbe

Sarcoptes scabiei



Zecke

Rhipicephalus sanguineus



Laus

Haematopinus suis



Floh

Ctenocephalides canis

INTEREX®

Wirkstoffbasis:

Cypermethrin 10 %

baua-Reg.-Nr.:

N-17202 (PT 18);

Lieferform:

250- und 500-ml-Flasche

Gefahrenhinweise

für das Konzentrat:

Piktogramme: GHS07, GHS09

Signalwort: GEFAHR

H-Sätze: H302, H317, H410

INTEREX® SPRAY

Wirkstoffbasis:

0,8 % Permethrin,

0,08 % Cypermethrin

0,1 mg/g Tetramethrine

baua-Reg.-Nr.:

N-86298 (PT 18)

Lieferform:

400-ml-Sprühdose

750-ml-Sprühdose

Gefahrenhinweise

für das gebrauchsfertige

Produkt:

Piktogramme: GHS02,

GHS07, GHS09 Signalwort:

GEFAHR H-Sätze: H222,

H229, H336, H410

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zu beziehen durch:

0623

W079

